



Ministero della Salute



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Programma Nazionale Esiti – PNE **Edizione 2017**

INDICATORE – MORTALITA' PROCEDURE ALTRO

Azienda ULSS 12 Veneziana
Azienda ULSS 13 Mirano
Azienda ULSS 14 Chioggia



ASL Veneziana					
INDICATORE	N	% GREZZA	% ADJ	RR ADJ	P
Frattura del collo del femore: mortalità a 1 anno	396	18,18	18.85	1,03	0,78
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni (struttura di ricovero)	233	69,53	71.49	1,02	0,565
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	381	9,97	8.86	1,03	0,862
Scadenza cardiaca congestizia: mortalità a 30 giorni	686	7,58	7.15	0,69	0,007
Scadenza cardiaca congestizia: riammissioni ospedaliere a 30gg	494	14,37	14.60	0,99	0,945
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	300	3,33	3.34	0,17	0
Parto naturale: ricoveri successivi durante il puerperio	2720	0,7	0.69	1,21	0,409
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni	86	6,98	6.60	1,63	0,218
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	414	8,21	8.43	0,77	0,147
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	383	5,74	5.99	0,84	0,4
BPCO riacutizzata: mortalità grave a 30 giorni	276	6,88	6.03	0,65	0,06
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale)	342	7,6	6.96	0,88	0,536
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	300	79	79.93	1,1	0
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	214	0,93	1.21	1,18	0,822
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni	39	5,13	5.23	1,09	0,906
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	90	0	-	-	-
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	260	11,92	12.51	0,94	0,695
Parto cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	879	1,59	1.51	1,77	0,033
Parto naturale: complicanze durante il parto e il puerperio (ASL di residenza)	2720	0,74	0.73	1,41	0,127
Parto cesareo: complicanze durante il parto e il puerperio (ASL di residenza)	879	1,37	1.31	1,68	0,071
Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	22	0	-	-	-
Emorragia non varicosa del tratto intestinale superiore: mortalità	273	5,49	4.30	1,11	0,707
Intervento di appendicectomia laparotomica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	32	6,25	5.60	1,98	0,327
Arteriopatia III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	52	7,69	8.54	1,66	0,312
Arteriopatia III e IV stadio: rivascularizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	52	25	26.79	1,44	0,127
Arteriopatia III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi dal ricovero	60	13,33	11.63	0,84	0,632
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	591	2,88	2.93	1,27	0,325
Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità	132	2,27	2.04	0,75	0,636
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	312	5,13	4.90	0,42	0,001
Proporzione di ricoveri per insufficienza renale cronica moderata-grave entro 2 anni da un ricovero per	41	14,63	13.87	0,85	0,684
Proporzione di ricoveri per evento acuto grave entro 2 anni da un ricovero per insufficienza renale	116	23,28	23.63	1,23	0,245
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per	267	12,36	12.65	1,53	0,01
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento	129	48,84	61.60	1,28	0,015
Intervento chirurgico per TM mammella: proporzione di interventi conservativi	487	65,71	-	-	-
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per	271	12,18	12.42	1,6	0,005
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	591	1,52	1.59	1,44	0,268
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità	263	2,66	3.07	1,16	0,702
Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso parto cesareo	190	17,37	18.31	2,26	0
Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni	116	24,14	20.79	1,27	0,231
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	1605	15,83	15.19	0,62	0
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	411	5,11	5.54	1,04	0,875
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	408	62,99	61.75	1,07	0,094
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA entro 2 giorni: mortalità a 30 giorni	211	3,79	3.23	0,73	0,382
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	82	2,44	2.08	1,23	0,767
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	131	1,53	1.83	1,49	0,574
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA oltre 2 giorni dal ricovero: mortalità a 30 giorni	54	3,7	3.76	1,11	0,883
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	712	1,83	1.88	1,59	0,093
Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	493	4,26	4.48	1,22	0,364
Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento	465	2,15	2.27	1,27	0,442
Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	384	0,78	0.83	0,61	0,394
Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro 2 anni dall'intervento	397	1,26	1.33	0,54	0,165
Intervento di protesi di spalla: riammissioni a 30 giorni	97	3,09	3.18	1,6	0,414
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni	381	55,38	56.50	1,26	0
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	79	3,8	3.82	0,62	0,41
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	301	4,32	3.69	0,9	0,71
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	124	0	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	361	11,63	13.28	1,31	0,105
Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno	361	19,67	20.33	0,95	0,626
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA nel ricovero indice o nei successivi entro 7	381	69,29	69.30	1,12	0,001
Ictus ischemico: mortalità a 1 anno	428	19,16	15.99	0,96	0,763
Ictus ischemico: MACCE a 1 anno	425	22,35	22.23	1,16	0,099
By-pass Aortocoronarico isolato: mortalità a 30 giorni	207	2,42	2.52	1,17	0,727

Dati relativi all'anno 2016 pubblicati da AGENAS – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Download dal sito <http://pne2017.agenas.it/>



ASL Milano					
INDICATORE	N	% GREZZA	% ADJ	RR ADJ	P
Frattura del collo del femore: mortalità a 1 anno	288	20,14	22.78	1,25	0,073
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni (struttura di ricovero)	109	81,65	81.09	1,16	0
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	235	9,36	9.60	1,12	0,619
Scadenza cardiaca congestizia: mortalità a 30 giorni	588	15,31	15.03	1,45	0
Scadenza cardiaca congestizia: riammissioni ospedaliere a 30gg	392	15,82	15.47	1,05	0,674
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	256	48,44	45.31	2,32	0
Parto naturale: ricoveri successivi durante il puerperio	2592	0,46	0.47	0,83	0,506
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni	98	3,06	3.42	0,85	0,768
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	290	10,69	11.49	1,05	0,772
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	264	4,92	5.19	0,73	0,241
BPCO riacutizzata: mortalità grave a 30 giorni	260	12,69	9.85	1,06	0,75
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale)	224	8,48	8.80	1,11	0,652
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	256	90,63	88.85	1,22	0
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	132	0,76	1.14	1,1	0,923
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni	38	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	41	2,44	2.91	1,21	0,853
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	231	16,88	16.42	1,23	0,171
Parto cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	1008	1,19	1.19	1,39	0,25
Parto naturale: complicanze durante il parto e il puerperio (ASL di residenza)	2592	0,69	0.69	1,33	0,23
Parto cesareo: complicanze durante il parto e il puerperio (ASL di residenza)	1008	1,59	1.53	1,95	0,007
Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	38	5,26	5.46	1,86	0,375
Emorragia non varicosa del tratto intestinale superiore: mortalità	203	5,42	4.93	1,27	0,449
Intervento di appendicectomia laparotomica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	10	0	-	-	-
Arteriopatia III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	28	3,57	2.89	0,56	0,566
Arteriopatia III e IV stadio: rivascularizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	28	10,71	10.06	0,54	0,265
Arteriopatia III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi dal ricovero	35	20	20.22	1,46	0,359
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	607	0,99	1.10	0,47	0,066
Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità	139	0,72	0.78	0,29	0,212
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	227	9,25	9.61	0,83	0,39
Proporzione di ricoveri per insufficienza renale cronica moderata-grave entro 2 anni da un ricovero per	18	22,22	19.27	1,19	0,72
Proporzione di ricoveri per evento acuto grave entro 2 anni da un ricovero per insufficienza renale	103	11,65	9.33	0,48	0,011
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per	209	23,92	22.68	2,75	0
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento	71	47,89	53.16	1,1	0,574
Intervento chirurgico per TM mammella: proporzione di interventi conservativi	357	70,59	-	-	-
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per	206	25,73	24.50	3,16	0
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	607	1,48	1.65	1,51	0,216
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità	198	2,02	2.08	0,78	0,627
Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso parto cesareo	217	15,21	15.87	1,96	0
Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni	48	10,42	10.15	0,62	0,286
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	1582	20,92	21.60	0,88	0,035
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	254	2,36	2.85	0,53	0,123
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	253	85,77	85.58	1,48	0
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA entro 2 giorni: mortalità a 30 giorni	140	12,14	10.19	2,3	0,001
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	40	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	107	0,93	0.93	0,75	0,78
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA oltre 2 giorni dal ricovero: mortalità a 30 giorni	47	0	-	-	-
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	661	0,76	0.76	0,64	0,317
Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	370	5,14	5.73	1,56	0,051
Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento	381	0,79	0.81	0,46	0,173
Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	290	0,34	0.37	0,27	0,191
Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro 2 anni dall'intervento	308	2,27	2.34	0,95	0,889
Intervento di protesi di spalla: riammissioni a 30 giorni	99	4,04	4.13	2,07	0,142
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni	235	59,57	59.34	1,32	0
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	83	3,61	3.55	0,58	0,345
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	163	0,61	1.20	0,29	0,22
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	68	0	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	251	5,98	6.95	0,68	0,16
Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno	251	27,89	31.20	1,46	0
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA nel ricovero indice o nei successivi entro 7	235	78,3	76.63	1,23	0
Ictus ischemico: mortalità a 1 anno	252	15,87	15.41	0,93	0,666
Ictus ischemico: MACCE a 1 anno	252	25	25.72	1,35	0,007
By-pass Aortocoronarico isolato: mortalità a 30 giorni	105	1,9	2.45	1,14	0,854

Dati relativi all'anno 2016 pubblicati da AGENAS – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Download dal sito <http://pne2017.agenas.it/>



ASL Chioggia					
INDICATORE	N	% GREZZA	% ADJ	RR ADJ	P
Frattura del collo del femore: mortalità a 1 anno	81	22,22	24.27	1,33	0,199
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni (struttura di ricovero)	27	51,85	57.44	0,82	0,272
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	103	10,68	9.09	1,06	0,861
Scadenza cardiaca congestizia: mortalità a 30 giorni	140	12,14	13.01	1,25	0,339
Scadenza cardiaca congestizia: riammissioni ospedaliere a 30gg	102	17,65	17.90	1,22	0,363
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	65	30,77	36.50	1,87	0,001
Parto naturale: ricoveri successivi durante il puerperio	486	1,23	1.27	2,24	0,047
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni	24	12,5	11.14	2,76	0,075
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	88	10,23	12.95	1,19	0,61
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	82	10,98	11.35	1,59	0,142
BPCO riacutizzata: mortalità grave a 30 giorni	46	6,52	7.42	0,8	0,696
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale)	98	8,16	7.10	0,9	0,771
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	65	76,92	82.45	1,13	0,011
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	26	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni	8	12,5	19.42	4,03	0,142
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	25	0	-	-	-
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	45	4,44	4.96	0,37	0,152
Parto cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	267	0,37	0.37	0,43	0,403
Parto naturale: complicanze durante il parto e il puerperio (ASL di residenza)	486	0,21	0.21	0,4	0,355
Parto cesareo: complicanze durante il parto e il puerperio (ASL di residenza)	267	0,75	0.74	0,94	0,935
Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	6	0	-	-	-
Emorragia non varicosa del tratto intestinale superiore: mortalità	86	2,33	1.76	0,45	0,272
Intervento di appendicectomia laparotomica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	11	0	-	-	-
Arteriopatia III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	8	0	-	-	-
Arteriopatia III e IV stadio: rivascularizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	8	25	24.94	1,34	0,639
Arteriopatia III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi dal ricovero	9	11,11	9.92	0,71	0,742
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	111	1,8	1.62	0,7	0,613
Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità	35	0	-	-	-
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	78	14,1	12.79	1,1	0,756
Proporzione di ricoveri per insufficienza renale cronica moderata-grave entro 2 anni da un ricovero per	8	12,5	12.67	0,78	0,793
Proporzione di ricoveri per evento acuto grave entro 2 anni da un ricovero per insufficienza renale	29	13,79	13.59	0,71	0,466
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per	39	33,33	38.98	4,72	0
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento	26	30,77	27.22	0,56	0,177
Intervento chirurgico per TM mammella: proporzione di interventi conservativi	101	60,4	-	-	-
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per	40	30	33.44	4,32	0
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	111	3,6	3.29	2,99	0,027
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità	29	0	-	-	-
Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso parto cesareo	51	7,84	7.01	0,87	0,777
Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni	41	21,95	21.09	1,28	0,453
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	337	24,93	30.80	1,26	0,025
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	63	1,59	2.08	0,39	0,345
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	63	84,13	82.75	1,43	0
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA entro 2 giorni: mortalità a 30 giorni	25	4	3.66	0,83	0,853
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	4	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	25	0	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA oltre 2 giorni dal ricovero: mortalità a 30 giorni	37	2,7	2.97	0,88	0,895
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	66	0	-	-	-
Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	78	3,85	4.09	1,11	0,855
Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento	100	0	-	-	-
Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	78	0	-	-	-
Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro 2 anni dall'intervento	95	2,11	2.14	0,87	0,843
Intervento di protesi di spalla: riammissioni a 30 giorni	22	4,55	5.51	2,76	0,297
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni	103	24,27	22.52	0,5	0
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	36	2,78	2.57	0,42	0,391
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	90	4,44	4.62	1,12	0,823
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	27	0	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	73	19,18	18.19	1,79	0,054
Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno	73	21,92	22.14	1,03	0,887
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA nel ricovero indice o nei successivi entro 7	103	58,25	61.15	0,98	0,854
Ictus ischemico: mortalità a 1 anno	69	20,29	17.38	1,05	0,874
Ictus ischemico: MACCE a 1 anno	68	16,18	16.13	0,84	0,548
By-pass Aortocoronarico isolato: mortalità a 30 giorni	39	2,56	2.66	1,24	0,836

Dati relativi all'anno 2016 pubblicati da AGENAS – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Download dal sito <http://pne2017.agenas.it/>